

Importancia en la economía

Restringe el comercio de animales y productos y subproductos (leche, carne, semen, embriones) derivados, al mercado internacional.

Retraso en el desarrollo de la ganadería del país.

Disminuye el inventario de los animales

Perdidas económicas al sector ganadero.

Nicaragua, País Libre de Fiebre Aftosa

En Nicaragua no existe la Fiebre Aftosa, por eso debemos estar alertas y reportar al oficial del IPSA de su localidad. El oficial tomará muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Referencia Regional para Enfermedades Vesiculares en Panamá (LADIVES).

Amigo ganadero, cuando observe; llagas en la boca, tetas y pezuñas en el ganado, cerdos o cualquier animal de pezuña hendida, no dude en comunicarse con las Delegaciones de Salud Animal que se indican en este material.

Nadie mejor que usted para proteger a sus animales.

Ubicación de las Delegaciones de Salud Animal

	REGIÓN	TELÉFONOS
I	Estelí Somoto Ocotal	85652973 86583813 86508508
II	León Chinandega	2311-0488 85652995
III	Managua	2278-3417 / 2270-1525
IV	Rivas Granada Carazo Masaya	85652981 84926071 83636459 89203756
V	Juigalpa Boaco	2512-0206 85652997
VI	Matagalpa Jinotega Matiguas	85652996 85652992 86909096
VII	Puerto Cabezas Siuna Bonanza	84970586 8741-0689 8847-8308
VII	Nueva Guinea Bluefields	86288900 84140555
IX	San Carlos	85652989

Cualquier sospecha de animales enfermos, notifique a la oficina del IPSA mas cercana.

Dirección de Salud Animal

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal

FIEBRE AFTOSA



Nicaragua es libre de fiebre aftosa

¡EVITEMOS SU INTRODUCCIÓN!

Fiebre Aftosa Ausente en el País

La Fiebre Aftosa es una enfermedad viral aguda muy contagiosa, que afecta al ganado bovino y numerosas especies animales de pezuña hendida como: cerdos, venados, saínos, entre otros.

Signos clínicos

- Salivación con babeo abundante y espeso.
- Fiebre alta.
- Inflamación de la ubre.
- Cojera.
- Perdida del apetito.
- Debilidad.
- Abortos.



Daños que ocasiona

- Ampollas superficiales en boca, fosas nasales, pezones, lengua, espacio interdígital (pezuñas).
- Las ampollas al reventarse dejan llagas sangrantes y dolorosas.
- Perdida de peso.
- Disminución de la producción de la leche y carne.
- Lesiones permanentes en algunos órganos internos como el corazón y rumen.
- Perdida de las pezuñas.
- Largos períodos de convalecencia, sin lograr la recuperación completa,

Transmisión

El virus de la Fiebre Aftosa, se puede transmitir directamente a través del contacto de animales enfermos con animales sanos, semen y embriones. De manera indirecta, a través de la eliminación del virus por la saliva, lesiones, orina y heces que contaminan el alimento, agua, equipos y materiales de trabajos. Los productos y subproductos provenientes de animales infectados, constituyen otra fuente importante de diseminación del virus. Entre estos tenemos: carne, quesos frescos, embutidos y carnes congeladas.

Enfermedades con las que se puede confundir

La estomatitis vesicular o meada de araña, presenta signos parecidos a los de la Fiebre Aftosa.

El análisis de muestras de tejidos y sangre efectuados en un laboratorio especializado, es la única forma de diferenciarlas.



Lesiones en pezuñas de cerdos y bovinos

Prevención y control

Amigo productor: Cuando los animales de pezuña presenten signos parecidos a la Fiebre Aftosa:

1. Aislar los animales enfermos del resto de los animales (en cuarentena).
2. Informar de inmediato al Médico Veterinario del IPSA de su localidad.



Lesiones en boca, lengua, encia y pezones.