

¿QUE MEDIDAS DEBE TOMAR EN SU FINCA?


Solicite al Médico Veterinario autorizado por la Dirección de Salud Animal del IPSA de su localidad, que realice las pruebas de Tuberculosis a sus animales



Envíe lo más rápido posible al matadero ó rastro, con inspección veterinaria oficial, a los animales que resulten positivos a la prueba de tuberculina y no los venda, así evitará que se propague la enfermedad, no lo traslade a otra finca.



Al comprar ganado exija que los animales posean un certificado oficial de prueba de Tuberculosis que los declare como animales sanos a esta prueba. De otra manera está comprando riesgosal introducir por medio de un animal enfermo, la Tuberculosis a su finca.



UBICACION DELEGACIONES SALUD ANIMAL

REGION TELEFONOS

I	• Estelí • Somoto • Ocotal	2713-6931 / 2714-1939 2722-2151 2732-3308
II	• León • Chinandega	2311-0488 2341-4229
III	• Managua	2278-3417 2270-1525 2278-4121
IV	• Rivas • Granada • Carazo • Masaya	2563-3022 2552-4583 2552-4554 2532-0433 2522-2425
V	• Juigalpa • Boaco	2512-0206 2542-1771
VI	• Matagalpa • Jinotega • Matiguás	2772-3611 8927-0962 2782-4026 2778-1340
VII	• Puerto Cabezas • Siuna • Bonanza	2792-2371 8741-0689 8847-8308
VII	• Nueva Guinea • Bluefields	2575-0180 2572-2095 2572-2499
IX	• San Carlos	2583-0369 2583-0226

Importante:

Notifique de inmediato al personal del IPSA más cercano a su localidad

Oficina Central

Teléfono 2270-9710 • Fax: 2270-1258/2270-5865
Km. 3 Carretera a Masaya.

Dirección de Salud Animal

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal

TUBERCULOSIS




BOVINA

¿QUE ES LA TUBERCULOSIS BOVINA?


Es una enfermedad crónica, causada por una bacteria. Puede enfermar a bovinos, caprinos y el hombre.

¿COMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?



- Un animal puede enfermar al entrar en contacto con otro animal enfermo.
- Al tomar agua o alimentos contaminados con secreciones nasales, orina y excrementos que contienen la bacteria.
- Al respirar cerca de un animal enfermo.
- Por las manos de los ordeñadores, al ordeñar una vaca tuberculosa y luego una sana.

La enfermedad se presenta con más frecuencia en vacas lecheras que en los animales de engorde.



LA TUBERCOLOSIS EN EL HOMBRE

La enfermedad se transmite de los animales al hombre, principalmente por el consumo de alimentos (leche sin hervir, queso fresco, cuajada, carne mal cocinada) o por contacto con animales enfermos.



La Tuberculosis en las personas ocasiona fiebre, decaimientos, tos seca, enflaquecimiento, sudoración nocturna y puede ocasionar la muerte.

¿POR QUE ES IMPORTANTE PREVENIR LA TUBERCULOSIS?

Las vacas que producen más leche, son las de mayor riesgo a enfermar. Muchas veces la Tuberculosis no presenta síntomas, pero las vacas tienden a:

- Bajar la producción de leche y carne.
- Los animales se ponen flacos y mueren.
- Animales enfermos pueden diseminar la enfermedad a otros animales.
- Es una enfermedad que se transmite al hombre.
- Disminuye la fertilidad.

¿QUE DEBO HACER SI SOSPECHO QUE MIS ANIMALES TIENEN TUBERCULOSIS?

Debe avisar de inmediato a las oficinas del IPSA de Salud Animal de su localidad y solicitar apoyo técnico.

¿QUE PASA SI UN ANIMAL ES REACTOR A LA TUBERCULOSIS?

El Médico Veterinario marca al animal con un fierro de letra "T" en el cachete izquierdo y con una calavera en el cachete derecho y se debe enviar el animal al rastro o al matadero donde haya un Médico Veterinario Oficial.

RECOMENDACIONES

Cuando una finca se considera libre de Tb, el Médico Veterinario de IPSA le realiza prueba a los animales para identificar los enfermos.

- Introducir animales a la finca con las pruebas de tuberculina negativas.
- Los animales recién llegados a la finca, deben estar en un corral aparte por un periodo de 15 días. (Cuarentena).
- Los animales deben estar bajo sombra con comida y agua abundante.
- Eliminación de animales enfermos.
- No consumir productos lácteos, sin estar bien cocidos.