

MONITOREO DE ROYA Y BROCA DEL CAFÉ

Monitoreo de Roya del cafeto (*Hemileia vastratix*)


El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), a través del Departamento de Vigilancia Fitosanitaria y Campañas es el responsable de Realizar el Monitoreo de Vigilancia Fitosanitaria de la Campaña Roya del Cafeto en Nicaragua. El presente Informe Anual, sintetiza los informes reportado por las delegaciones departamentales del IPSA en las zonas cafetaleras, con un total de 95 Fincas de Referencias a Nivel Nacional programadas para realizar el Monitoreo de la Campaña Roya.



Afectación por roya del cafeto en hojas de café arábigo

Para el año informado el comportamiento de la roya del cafeto refleja que los meses de junio, julio y agosto son los meses que reportan la menor incidencia y los meses de enero, febrero y marzo los meses que reflejan la mayor incidencia. Siendo el municipio de Somoto en el departamento de Madriz con 21.93% y El Sauce en el departamento de León con 18.52% de incidencia en el año 2024.

La variedad de café Bourbon con 15.70%, Pacas con 5.30% y Marsellesa con 5,00% están entre las variedades de café arábigo que presentaron mayor incidencia de Roya del café, mientras que la variedad Robusta presentó una incidencia de 1.8% de incidencia.




Monitoreo de Broca del cafeto (*Hypotenemus hampei*)

Por su parte la incidencia de **Broca del café** (*Hypotenemus hampei*), tuvo un promedio de incidencia en el año 2024 de 2.75% siendo los meses de julio a diciembre los que reportan la menor incidencia y los meses de marzo, abril y mayo los meses que reflejan la mayor incidencia



Daño en fruto por Broca del café y trampa utilizada en el monitoreo de Broca del café.

Siendo el municipio mayor incidencia Camoapa en el departamento de Boaco con un 20.77% de incidencia de Broca del café.



Las variedades de café arábigo Catuai amarillo con 22.90% y Pacas con 14.6% son los que presentaron mayor incidencia de broca del café en la etapa de fructificación, mientras que café Robusta presentó una incidencia de 1.2%.